
ARS **Primera**

Esquema Nacional de Vacunación

Vacunar a tus hijos es la mejor protección contra más de **23 enfermedades infectocontagiosas** graves.




Recién Nacido

- **BCG**
- **Hepatitis B**




2 Meses

- **DPT** (1ª)
- **Polio Inyectable** (1ª)
- **Rotavirus** (1ª)
- **Neumococo** (1ª)



4 Meses

- **DPT** (2ª)
- **Polio Inyectable** (2ª)
- **Rotavirus** (2ª)
- **Neumococo** (2ª)



6 Meses

- **DPT** (3ª)
- **Polio Inyectable** (2ª)



9 Meses

- **Sarampión.**



12 Meses

- **Neumococo** (3ª)
- **(SPR)** (1ª)



18 Meses

- **DPT** (1ª Refuerzo)
- **Polio Oral** (1ª Refuerzo)
- **(SPR)** (2ª Refuerzo)


4 Años

- **DPT** (2ª Refuerzo)
- **Polio Oral.** (2ª Refuerzo)

- **BCG:** Vacuna contra tuberculosis.
- **DPT:** Vacuna contra difteria, pertusis, tétanos.
- **SPR:** Vacuna contra sarampión, paroditis, rubéola.

ARS **Primera**

Conoce más



Tuberculosis miliar y Meningitis tuberculosa: Pueden ser mortales y se diseminan en el pulmón, higado, bazo o meninges.

Vacuna PENTAVALENTE (DPT)

• **Difteria:** afecta las amígdalas, garganta, nariz, músculo cardíaco, fibras nerviosas o de piel. Puede ser mortal.

• **Tos convulsiva:** es altamente contagiosa y ocasiona accesos de tos violenta e incontrolable que pueden durar semanas o meses. No confundir coN resfriado común.

• **Tétanos:** infección que causa dolorosa contracción muscular en todo el cuerpo, que impide abrir la boca, deglutir o lactar, se corre el riesgo de morir por asfixia.

• **Hepatitis B:** virus grave que causa daño al hígado, cáncer, cirrosis hepática.

• **Influenza tipo B (Haemophillus):** enfermedad bacteriana muy contagiosa y que puede causar neumonia y meningitis.

• **Polio o Poliomielitis:** puede ocasionar parálisis irreversible. Los síntomas que presentan son fiebre leve, dificultad para pararse y caminar, dolores musculares y deshidratación severa.

• **Rotavirus:** es la causa más común de la diarrea grave en lactantes y niños pequeños.

• **Neumococo:** infección de transmisión respiratoria. Puede ocasionar otitis, sepsis, meningitis y neumonías graves en niños menores 5 años.

Vacuna SPR o TRIPE VIRAL (Vacuna contra sarampión, paroditis, rubéola) .

• **Parotiditis o papera:** ocasiona inflamación dolorosa de las glándulas salivales. Se contagia a través de gotas de saliva producidas al hablar o toser.

• **Rubéola:** puede causar problemas articulares, lesiones en la piel y problemas cardiacos, entre otros.

• **Sarampión:** puede causar neumonía, convulsiones, encefalitis, ceguera, sordera, retraso mental e incluso la muerte de niños desnutridos. Se transmite a través de gotas de saliva que una persona enferma produce al toser o estornudar.

Para más información sobre los programas de Promoción y Prevención, llámanos a nuestro Centro de Atención al Cliente (809)476.3535.

@arsprimera www.arsprimera.com